
marzo 2006

PAPERS 



**MUTILACIÓN
GENITAL
FEMENINA
EN EL MUNDO**

Un documento elaborado por **Jaime Serra**

– En los siglos XIX y principios del XX se practicaba la circuncisión femenina en los países occidentales -de manera notable en EEUU- para prevenir la masturbación, los ‘excesos sexuales’, la histeria y la epilepsia.

– La circuncisión femenina, no se menciona en ningún texto sagrado, sea judío, cristiano o musulmán, con la excepción de narraciones atribuidas, de modo poco fiable, a Mahoma.

– Historiadores como Herodoto refieren que en el siglo V, fenicios, hititas, etíopes y egipcios ya practicaban la circuncisión femenina.

– Se trata de una tradición pre-islámica y no se practica en todos los países musulmanes.

– En los países del Golfo -con la excepción de Yemen- la mutilación genital femenina es muy infrecuente.

– En la mayoría de los países islámicos del Mediterráneo, la práctica ha caído en desuso. Esto bastaría para indicar que su significación con la religión islámica no tiene gran fundamento.

135 millones

de mujeres han sufrido alguna mutilación sexual

200.000

la padecen cada año

6.000

cada día

5

cada minuto

Definición de ablación genital femenina según la OMS


La ablación, o mutilación genital femenina, comprende todos los procedimientos quirúrgicos que consisten en la extirpación total o parcial de los genitales externos, u otras intervenciones practicadas en los órganos genitales femeninos por motivos culturales o no terapéuticos.

– Los trastornos psicológicos también pueden ser graves: ataques de pánico, depresión severa, fobias.

– No hay estadísticas que indiquen cuantas niñas se desangran hasta morir por estas practicas. Muchos padres prefieren dejar morir a sus hijas antes que enfrentar la humillación pública.

– Las parteras mantienen una relación con las mujeres circuncidadas durante el resto de sus vidas. Están presentes no solo en la circuncisión, también en la noche de bodas y son incontables los casos en que son llamadas a la cámara nupcial para desinfibular o cortar a la novia para permitir la penetración. La consumación del matrimonio puede durar semanas, las mujeres experimentan grandes dolores durante el proceso de penetración gradual que puede durar hasta dos o tres meses. El orificio es apenas lo suficientemente grande para permitir la penetración, que debe tener lugar frecuentemente durante los primeros días y semanas del matrimonio para evitar que la herida abierta se cierre.

Mujeres con mutilaciones que quedan impedidas para tener hijos.



Clasificación según tipo de mutilación.

La Organización Mundial de la Salud considera cuatro tipos de mutilación según el nivel de agresión y las consecuencias que estas pueden tener.

1 Clitoridectomía

2 Escisión

3 Infibulación

4 Sin clasificación

Todos los demás procedimientos que impliquen extirpación total o parcial de los genitales femeninos y/o lesiones de los órganos genitales femeninos ya sea por razones culturales o por cualquier otra razón no terapéutica.

ANATOMÍA GENERAL FEMENINA

Prepucio del clitoris.


Glande del clitoris.

Uretra.

Labios mayores.

Labios menores.

Canal vaginal.




1 CLITORIDECTOMÍA

En rojo las partes mutiladas.


ZONA MUTILADA

Extirpación del prepucio con o sin escisión parcial o total del glánde del clítoris.



RESULTADO DE LA MUTILACION

Una vez efectuada la mutilación, se aplican paños de hierbas y huevo para facilitar la cicatrización.




2 ESCISIÓN

En rojo las partes mutiladas.


ZONA MUTILADA

Extirpación del prepucio y del clítoris junto con la escisión parcial o total de los labios menores.



RESULTADO DE LA MUTILACION

Se actúa igual que en la clitoridectomía




3 INFIBULACIÓN

En rojo las partes mutiladas.


ZONA MUTILADA

Extirpación parcial o total de los genitales externos y sutura con estrechamiento de la apertura vaginal.



RESULTADO DE LA MUTILACION


Se estrecha el canal vaginal cosiendo la herida, generalmente con hilo de pescar o alambre. Se deja una pequeña **apertura**, para que la mujer pueda orinar y evacuar la menstruación.



Una mujer con este tipo de intervención necesita entre 10 y 15 minutos para orinar.


Países donde se practica algún tipo de mutilación genital femenina.

- Países con practica habitual y estadísticas de casos.
- Países donde se conoce la existencia de la practica de forma aislada.



Situación en africa

País	% de mujeres mutiladas	Tipo de mutilación	Legislación
Sudán	 90%	Infibulación	Prohibida la infibulación. Desde 1946
Tanzania	 20%	Excisión e infibulación	No existe
Togo	 12%	Excisión	Prohibida. Desde 1998
Uganda	 5%	Clitoridectomía y excisión	No existe
Yibuti	 90-95%	Excisión e infibulación	Prohibida. Desde 1994
Kenia	 40%	Clitoridectomía y excisión	Prohibida. Desde 1982
Liberia	 50-60%	Excisión	No existe*
Mali	 90-94%	Todas	No existe
Mauritania	 70%	Clitoridectomía y excisión	No existe
Niger	 10%	Excisión	No existe
Nigeria	 20%	Todas	No existe
Rep. Dem. del Congo	 5%	Excisión	No existe
Senegal	 20%	Excisión	Prohibida. Desde 1998
Sierra Leona	 80-90%	Excisión	No existe**

Pais	% de mujeres mutiladas	Tipo de mutilación	Legislación
Somalia	 98%	Infibulación	Prohibida. Desde 1978
Benin	 20%	Excisión	No existe
Burkina Faso	 70%	Excisión	Prohibida. Desde 1987
Camerún	 20%	Clitoridectomía y excisión	No existe
Rep. Centroafricana	 50%	Clitoridectomía y excisión	Prohibida. Desde 1966
Chad	 60%	Excisión e infibulación	No existe
Costa de marfil.	 60%	Excisión	Prohibida. Desde 1998
Egipto	 97%	Todas	Prohibida. Desde 1997
Eritrea	 90%	Todas	No existe
Etiopia	 90%	Todas	No existe
Gambia	 60-90%	Excisión	No existe
Ghana	 10-15%	Excisión	Prohibida. Desde 1994
Guinea	 98%	Todas	No existe
Guinea-Bissau	 50%	Clitoridectomía y excisión	No existe

* En 1994 tras un proceso una persona que practicó la excisión y varios miembros de la sociedad secreta Vai Sande fueron condenados al pago de 500 \$ a la familia de una joven mutilada por heridas inflingidas por la fuerza y contra su voluntad.

** En 1953, varias mujeres de la sociedad secreta bundu fueron condenadas a penas de prisión por haber practicado la excisión forzada.

Mutilación genital femenina en el mundo.

Fuentes de informacion:
Organizacion Mundial de la
Salud. UNICEF, informe anual
2003. Sami A. Aldeeb
Abu-Sahlieh, Consejero legal
para la Ley islámica y árabe del
Instituto Suizo de Legislación
comparativa, Lausana, Suiza.

Informe realizado por
El Centre S.C.P.®

Travesera de Gràcia 15,
entlo. 1ª 08021 Barcelona.
tel. 932 003 749.
www.elcentre.info
elcentre@elcentre.info

Barcelona. Marzo de 2006.